

AŞI TAKVİMİ

Aşılanma mümkün olduğu kadar erken başlatılmalıdır. Her yaş grubu ile ilgili aşı testleri yapılabilir. Geçerli yaş grubu aşı testi sonucuna göre eksik olan aşılar hemen yapılmalıdır.

Sprache: Türkisch

Tavsiyeler: Yetkili Aşı Komisyonu -
Ständige Impfkommision
(STIKO), 2015.
www.stiko.de

ROBERT KOCH INSTITUT



| YAŞ | (hafta) | Bebekler | | (ay) | Küçük Çocuklar | | Çocuklar | | | (yıl) | Gençler | | Erişkinler | |
|-------------------------------------|---------|----------|------|------|-----------------------|-------|----------|------|-----|---|----------------|---------|------------|--|
| | 6 | 2 | 3 | 4 | 11-14 | 15-23 | 2-4 | 5-6 | 7-8 | 9-14 | 15-17 | 18 üstü | 60 üstü | |
| AŞI | | | U4 | | U6 | U7 | U7A/8 | U9 | U10 | J1 | | | | |
| Tetanos | | G1 | G2 | G3 | G4 | N | A1 | N | A2 | A (her 10 yılda bir veya arayı kapatma aşıları) f | | | | |
| Difteri | | G1 | G2 | G3 | G4 | N | A1 | N | A2 | A (her 10 yılda bir veya arayı kapatma aşıları) f | | | | |
| Boğmaca Pertussis | | G1 | G2 | G3 | G4 | N | A1 | N | A2 | A (gerektiğinde, arayı kapatma aşıları) f | | | | |
| Çocuk felci Polyomyelit | | G1 | G2 a | G3 | G4 | N | | | A1 | N (gerektiğinde, arayı kapatma aşıları) | | | | |
| Hepatit B | | G1 | G2 a | G3 | G4 | N | | | | | | | | |
| Hib Haemophilus Influenzae Tip B | | G1 | G2 a | G3 | G4 | N | | | | | | | | |
| Pnömonok b | | G1 | | G2 | G3 | N | | | | S c | | | | |
| Rota virüsleri | G1 b | G2 | (G3) | | | | | | | | | | | |
| Menengokok Sero grubu C | | | | | G1 (12 ay ve üstü) | | N | | | | | | | |
| Kızamık | | | | | G1 | G2 | N | | | | S d | | | |
| Kabakulak Kızamıkçık | | | | | G1 | G2 | N | | | | | | | |
| Suçiçeği Varisella | | | | | G1 | G2 | N | | | | | | | |
| Grip Enflüanza | | | | | | | | | | | S (her yıl) | | | |
| HPV Insancıl Papilom Virüsleri | | | | | | | G1 e | G2 e | N e | | | | | |

Sonraki aşılanma tarihleri



Gefördert durch:
Bundesministerium
für Gesundheit

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

AÇIKLAMALAR

- G** TEMEL AŞILAR (4'e kadar kısmi aşılanma G1-G4)
- S** STANDART AŞILAR
- A** TEKRARLANAN AŞILAR
- N** TELAFİ AŞILARI (bütün aşılanmamış veya eksik aşı dizileri için temel aşı programı)
- U** Erken tanı araştırmaları
- J** Gençler için araştırmalar (J1 12-14 yaşları arasında)

- a** Tek değerli aşı kullanıldığında bu dozdan vazgeçilebilir.
- b** Birinci aşı altıncı haftadan itibaren yapılmalıdır. Kullanılan aşı maddesine bağlı olarak en az dört haftalık aralıklarla ikinci ve üçüncü dozların uygulanması gerekmektedir.
- c** Polisakarit aşı ile bir defaya mahsus aşılanma, tekrar aşısı sadece belli endikasyonlarda önerilmektedir.
- d** 1970 yılından sonra doğmuş, 18 yaşından büyük ve aşılanma durumu şüpheli olan, aşılanmayan veya çocukluk çağında sadece bir defa aşılanmış tüm bireyler için bir defaya mahsus aşılanma. Tercihen MMR aşı maddesi ile.

- e** 9-13 veya 9-14 yaş arası kız çocukları için standart aşılanma (kullanılan aşuya bağlı), aşı dozlarının sayısı için aşı takvimine bakınız!
- f** Td tekrar aşısı her 10 yılda bir. Bir sonraki Td aşısı ilgili endikasyonda bir defaya mahsus olmak üzere Tdap-IPV kombine aşısı olarak uygulanmalıdır.
- g** Erken doğan bebeklere 3 aylık ek bir aşı yapılır. Yani toplamda 4 doz alırlar.